

## Dénomination du médicament

**STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille**  
**Amylmétacrésol, Alcool dichloro-2,4 benzylique, Acide ascorbique**

## Encadré

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament est une spécialité d'automédication, qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille ?
3. Comment utiliser STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique Antiseptique local - code ATC : R : système respiratoire

Ce médicament contient 2 antiseptiques locaux (l'amylnmétacrésol et de l'alcool dichloro-2,4 benzylique) et de la vitamine C.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille ?

**Ne prenez jamais STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille :**

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez les enfants de moins de 6 ans (en raison de la taille des pastilles).

### Avertissements et précautions

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche et de la gorge.

En raison d'un effet légèrement stimulant dû à la présence de vitamine C (100 mg par pastille), il est préférable de ne pas prendre ce médicament en fin de journée.

### Mal de gorge

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 3 jours: **CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.**

### Aphtes, petites plaies de la bouche:

En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre: **CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille.

### **Autres médicaments et STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille**

Ce médicament contient 2 antiseptiques locaux (l'amylnmétacrésol et de l'alcool dichloro-2,4 benzylique) et de la vitamine C.

D'autres médicaments en contiennent : ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

### **STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### **Grossesse**

L'utilisation de STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille est déconseillée pendant la grossesse et chez les femmes en âge d'avoir des enfants

n'utilisant pas de contraception.

#### Allaitement

Un risque pour les nouveau-nés/nourrissons allaités ne peut être exclu. STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

**STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille contient des excipients à effet notoire : Glucose, Saccharose, Jaune orangé S (E 110), Rouge cochenille A (E 124), Amidon de blé (contenant du gluten), Propylène glycol, Sodium, Arôme contenant du citral, citronellol, géraniol, d-limonène et linalol, Sulfites - anhydride sulfureux (E 220)**

Ce médicament contient 0,97 g de glucose et 1,44 g de saccharose par pastille. Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient 2 agents colorant azoïque, du jaune orangé S (E110) et du rouge cochenille A (E124) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient une très faible teneur en gluten (provenant de l'amidon de blé). Il est considéré comme « sans gluten » et est donc peu susceptible d'entraîner des problèmes en cas de maladie cœliaque. Une pastille ne contient pas plus de 19,36 microgrammes de gluten. Si vous avez une allergie au blé (différente de la maladie cœliaque), vous ne devez pas prendre ce médicament.

Ce médicament contient 3 mg propylène glycol par pastille.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par pastille, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Ce médicament contient un arôme contenant du citral, citronellol, géraniol, d-limonène et linalol. Le citral, citronellol, géraniol, d-limonène et linalol peuvent provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient des sulfites et peut, dans de rares cas, provoquer des réactions d'hypersensibilité sévères et des bronchospasmes.

### 3. COMMENT UTILISER STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille ?

#### Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

La dose recommandée chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : 1 pastille, 3 à 6 fois par jour.

Sucer lentement la pastille sans la croquer, ni l'avalier en espaçant les prises.

Il est préférable de sucer la pastille à distance des repas.

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours

Si vous avez l'impression que l'effet de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Si vous avez pris plus de STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille que vous n'auriez dû :** Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de symptômes anormaux.

**Si vous oubliez de prendre STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille :** Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille :** Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Réactions allergiques pouvant se manifester sous la forme d'éruptions cutanées, d'urticaire, de gonflements du visage ou de la gorge (d'angio-œdème), de difficultés à respirer (bronchospasmes) ou d'hypotension avec perte de connaissance (syncope) : dans ce cas, arrêtez le traitement,

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 5. COMMENT CONSERVER STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Conservez ce médicament à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

#### Ce que contient STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille

- Les substances actives sont :

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Amylmétacrésol.....                 | 0,6000 mg  |
| Alcool dichloro-2,4 benzylique..... | 1,2000 mg  |
| Acide ascorbique.....               | 33,5000 mg |
| Ascorbate de sodium.....            | 74,9000 mg |

Pour une pastille.

· Les autres composants sont :

Saccharose / Glucose (amidon de blé (contenant du gluten), sulfites (anhydride sulfureux (E 220))) / Acide tartrique / Arôme orange PHL-105288 (cital, citronellol, géraniol, d-limonène, linalol) / Propylène glycol / Lévomenthol/ Jaune orangé S (E110) / Rouge cochenille A (E124)  
Teneur en vitamine C par pastille : 100 mg par pastille

#### **Qu'est-ce que STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille et contenu de l'emballage extérieur**

Boîte de 24 pastilles à sucer.

#### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

##### **RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE**

38 RUE VICTOR BASCH  
CS 11018  
91305 MASSY CEDEX

#### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

##### **RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE**

38 RUE VICTOR BASCH  
CS 11018  
91305 MASSY CEDEX

#### **Fabricant**

##### **RB NL BRANDS B.V.**

WTC SCHIPHOL AIRPORT,  
SCHIPHOL BOULEVARD 207,  
1118 BH SCHIPHOL,  
PAYS-BAS

#### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

#### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

#### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).